

NHOフォーミュラリーー覧

① PPI/Pcab剤（内服薬）

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 胃潰瘍（GU）	ランソプラゾール00錠 （小児はエソメプラゾールMg水和物のみ適応）	エソメプラゾールMg水和物Cp ボノプラザンフマル酸塩錠
2 十二指腸潰瘍（DU）		
3 逆流性食道炎		
4 吻合部潰瘍		エソメプラゾールMg水和物Cp
5 Zollinger-Ellison症候群		
6 非びらん性胃食道逆流症	ランソプラゾール00錠	エソメプラゾールMg水和物Cp ボノプラザンフマル酸塩錠
7 低アスピリン投与時のGU, DUの再発抑制		
8 NSAID s 投与時におけるGU, DUの再発抑制		

なお、簡易懸濁不可かつ散剤での投与が必要な場合のみ、エメプラゾールMg水和物懸濁用顆粒剤を使用。

② スタチン剤

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高脂血症	プラバスタチンナトリウム錠	ピタバスタチンカルシウム錠 アトルバスタチン錠
高コレステロール血症	ロスバスタチン錠 (10歳以上の小児はピタバスタチン錠のみ適応)	
家族性高コレステロール血症		

③ フィブラート系高脂血症薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高脂血症	ベザフィブラート徐放錠 フェノフィブラート錠	ペマフィブラート錠

④ H2遮断内服薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 胃潰瘍・十二指腸潰瘍・逆流性食道炎	ファモチジン錠・00錠 （散剤投与が必要な場合： ファモチジン散）	ラフチジン錠 ニザチジン錠
2 胃炎・慢性胃炎の急増悪期の胃粘膜病変（びらん・出血・発赤・浮腫）の改善		ラフチジン錠
3 吻合部潰瘍		
4 上部消化管出血・Zollinger-Ellison症候群		ラフチジン錠
5 麻酔前投薬	ラフチジン錠	

⑤ 尿酸生成阻害薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 痛風	フェブキソスタット錠 アロプリノール錠	トピロキソスタット錠
2 高尿酸血症		
3 がん化学療法に伴う高尿酸血症	フェブキソスタット錠	

⑥ 降圧薬（ARB）

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高血圧症	オルメサルタン錠・00錠 テルミサルタン錠・00錠 カンデサルタン錠・00錠 （1歳以上の小児は、 カンデサルタン錠・00錠）	アジルサルタン錠
腎実質性高血圧症	カンデサルタン錠・00錠	
ACE阻害薬投与が適切でない慢性心不全		
高血圧及び蛋白尿を伴う 2型DMのDM性腎症		

⑦ 降圧薬（ACE阻害薬）

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 （本態性）高血圧症	エナラプリルマレイン酸塩錠 （散剤投与が必要な場合： エナラプリルマレイン塩細粒1%）	イミダプリル塩酸塩錠 ペリンドプリルエルブミン錠
2 腎性高血圧症		イミダプリル塩酸塩錠
3 腎血管性高血圧症		
4 悪性高血圧症		
5 慢性心不全		
6 糖尿病性腎症（Ⅰ型糖尿病）	イミダプリル塩酸塩錠	

⑧ ビスホスホネート製剤内服薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	第三選択薬
骨粗鬆症	アレンドロン酸錠35mg （週1回投与）	リセドロン酸Na錠17.5mg （週1回投与）	ミノドロン酸錠50mg （4週1回投与）

・錠剤での服用が困難な場合のみ、アレンドロン酸経口ゼリー35mgを使用。

⑨ 糖尿病薬（α-グルコシダーゼ阻害薬）

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 糖尿病の食後過血糖の改善	ボグリボース錠・00錠	ミグリトール錠・00錠 アカルボース錠・00錠
2 耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制	ボグリボース錠・00錠	

⑩ 糖尿病薬（グリニド系薬）

効能効果	第一選択薬	第二選択薬
2型糖尿病	レバグリニド錠 ミチグリニドCα・00錠	ナテグリニド錠

⑪ ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬（成人高血圧症）

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高血圧症	アムロジピン00錠 ニフェジピンCR錠	ベニジピン錠 シルニジピン錠 アゼルニジピン錠